



แนวทางปฏิบัติการชุดหีนน้ำลาย
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เอกสารภายในที่ถูกรควบคุม		
รหัสเอกสาร : S-DE-004	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นฉบับ	
แก้ไขครั้งที่ 00 จำนวนหน้า 1	<input checked="" type="checkbox"/> ตำแหน่งที่ 6	
ประกาศใช้ : 8/14/2550		
จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
		

CPG การชูดหินน้ำลาย

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ผู้ปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	หมายเหตุ
ทันตแพทย์ / ทันตภิบาล	<p>1. ชักประวัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลผิดปกติหลังการชูด หรือแผลหายยาก ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเลือด เป็นต้น - คัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดสติเป็นลม เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคลมชัก เป็นต้น - คัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาและควบคุมโรคทางระบบโดยแพทย์เสียก่อน - ต้องระวังผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ไม่ทำให้เกิดความเครียดจากการรักษา เช่น นัดมารับการรักษาในช่วงเช้า ถ้าผู้ป่วยมีอาการหอบหืดให้พ่นยาก่อนการรักษา - ควรรอให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อ
ผู้ช่วยทันตแพทย์	<p>2. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมชุดตรวจและแก้วน้ำ - เตรียมผ้าก๊อชและสำลี - เตรียมผงทรายละเอียดผสมน้ำพอหมาด - ต่อหัวขัดยางกับหัวกรอช้า - ต่อสายดูดน้ำกับท่อดูดน้ำลาย - ต่อเครื่องชูดหินน้ำลายกับยูนิตทันตกรรม - เปิดเครื่องเดินน้ำที่ตกค้างออกจนหมด - ใส่หัวชูดหินน้ำลายบิดจนแน่น - ปรับความแรงหัวชูดและปริมาณน้ำจนเกิดเป็นละอองฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ลองเดินเครื่องต้องไม่มีน้ำออกจากรอยต่อ - ลักษณะละอองฝอยจะช่วยลดความร้อนจากการชูด

ผู้ปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ทุกคน	<p>3. การป้องกันตนเอง</p> <p><u>ทันตแพทย์ / ทันตภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สวมเสื้อกาวน์ยาว - ใส่หมวกเก็บผม - สวมผ้าปิดปาก - สวมหน้ากากพลาสติก - ล้างมือด้วยวิธี Hygeinic method 6 ขั้นตอน - เช็ดมือด้วยผ้าสะอาด - สวมถุงมือ <p><u>ผู้ช่วยทันตแพทย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สวมผ้ากันเปื้อน - ใส่หมวกเก็บผม - สวมผ้าปิดปาก - ล้างมือด้วยวิธี Hygeinic method 6 ขั้นตอน - เช็ดมือด้วยผ้าสะอาด - สวมถุงมือ 	
ทันตแพทย์	<p>4. เตรียมผู้ป่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับให้ผู้ป่วยนอนราบในระดับสอก - คลุมผ้ากันเปื้อน และผ้าขนหนูช่วยซับน้ำให้ผู้ป่วย 	
ทันตแพทย์ / ทันตภิบาล	<p>5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชูดคราบหินน้ำลายและคราบสีด้วยเครื่อง Ultra sonic scaler - ตรวจสอบคราบหินน้ำลายตกค้างด้วย Explorer - ถ้ามีจุดที่เลือดไหลให้ใช้สำลีกดให้เลือดหยุดเสียก่อน - ขัดฟันด้วยผงทรายละเอียด - ให้ผู้ป่วยบ้วนปากทำความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ขูดไม่หมดอาจพิจารณาใช้ Hand Instrument ขูดซ้ำ

ผู้ปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	หมายเหตุ
ทันตแพทย์ / ทันตภิบาล	<p>6. ให้คำแนะนำหลังการรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาให้ทันตสุขศึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น สอนการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การใช้แปรงซอกฟัน การเลือกซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และการรับประทานอาหาร เป็นต้น - ให้คำแนะนำหลังการรักษา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ในสัปดาห์แรกอาจมีอาการเจ็บเหงือกและเสียวฟันบ้าง ให้พยายามแปรงฟันให้ได้ตามปกติ เมื่อเหงือกหายอักเสบอาการดีขึ้น - ควรกลับมาตรวจสุขภาพช่องปากและดูดหินน้ำลายทุก 6 เดือน 	